

带状疱疹予防接種についてのワクチン比較表

	乾燥弱毒生水痘ワクチン 「ビケン」(生ワクチン)	乾燥組換え带状疱疹ワクチン 「シングリックス筋注用」(組換えワクチン)
用法 用量	皮下に 1 回接種	筋肉内に2回接種 接種間隔は通常 2 ヶ月間隔
予防 効果 (有効性)	60 歳以上:51% ～年齢層別予防効果～ 50-59 歳:69.8% 60-69 歳:64.0% 70-79 歳:41.0% 80 歳以上:18.0%	50 歳以上:97.2% ～年齢層別予防効果～ 50-59 歳:96.6% 60-69 歳:97.4% 70-79 歳:91.3% 80 歳以上:91.4%
予防効果 持続期間	5 年程度	11 年程度
副反応	接種後 50.6%に副反応 ・注射部位の紅斑 44.0% ・掻痒感 27.4% ・熱感 18.5% ・腫 脹 17.0% ・疼痛 14.7%など	【2回接種合計】 注射部位副反応は 80.8% ・疼 痛 78.0% ・発赤 38.1% ・腫脹 25.9%など 全身性副反応は 64.8% ・筋肉痛 40.0% ・疲労 38.9% ・頭痛 32.6%など
併用禁忌・ 注意	【併用禁忌】 ・副腎皮質ステロイド剤(プレドニゾロン等) ・免疫抑制剤(シクロスポリン、タクロリムス、 アザチオプリン等) 【併用注意】 ・輸血及びガンマグロブリン製剤 ・他の生ワクチン製剤	なし
自己負担金	3,000 円	8,000 円/回

引用文献：一般社団法人 日本ペインクリニック学会 带状疱疹ワクチンの定期接種開始に向けての声明文